


MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON



Thaiföldi rizs: megfelelő öntözés növeli a száraz évszak vetésterületét

Thaiföld 2016/17 év rizs termelését 18,6 millió metrikus tonnára (őrölt alapon) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 18%-al növekedett a múlt évhez képest. Betakarított területet 10,0 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 7%-al növekedett a múlt évhez képest. Hozamot az átlagosnál valamivel magasabbra 2,80 tonnára hektáronként becsülték. Thaiföld 2016-ban nagyrészt felépült a két évig tartó nagy szárazságtól (El Nino-val összefüggve), mely jelentősen csökkentette a készleteket az öntözésre és a rizs alatt levő területeket az országban. Bőséges csapadék a legutóbbi nyári esős évszak alatt megtöltötte a fontos víztárolókat melyek ellátják a mezőgazdasági szektort és lehetővé tette a kormánynak, hogy a korlátozásokat melyek a 2016-17 száraz évszak (Novembertől-Május végéig) alatt az öntözött rizs vetésterületére vonatkoztak megszüntesse. A földművesek erre a rizs vetésterület növelésével reagáltak, becslések szerint 975,000 hektár az előző évhez képest.

Friss MODIS műholdképek megerősítették a jelentős növekedést a száraz szezonú rizs vetésterületében. A normalizált eltérés növényzeti indexe (NDVI - the normalized difference vegetation index) azt mutatja, hogy a termés fejlődése az átlagnál jobb a kulcsfontosságú száraz szezonú rizs termelő területeken. Thaiföld Királyi Öntözési Részlege (Royal Irrigation Department) Február elején beszámolt arról, hogy a földművesek az előző évhez képest több mint kétszeresére növelték a vetésterületet és hogy az ültetés folytatódni fog Februárban is. Történelmileg, a Thai földművesek körülbelül 2,0 millió hektárt vetettek be a száraz szezon alatt, amelyből 80% teljesen öntözött.

Kukorica Mexikóban: rekord termelést becsültek

USDA Mexikó 2016/17 évi kukorica termelését rekord 26,0 millió metrikus tonnára becsülte fel, ami 6%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és némileg magasabb a múlt évi rekordtól mely 25,9 millió tonna volt. Betakarított területett 7,5 millió hektárra becsülték, ami 6%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 4%-os növekedés a múlt évhez képest. Hozamot felbecsülték 3,47 millió metrikus tonnára hektáronként (mt/ha), kissé növekedett a múlt hónaphoz képest de 4%-al csökkent a múlt évi rekordtól mely 3,60 mt/ha volt.



Szabálytalan csapadék Júniusban és Júliusban a tavasz/nyár termési időszakra késleltette az ültetést akár négy hétig a fő kukorica termőterület egyes részein. Kedvező csapadék az egész hátralevő termő időszakban javított a kilátásokon.

A csapadék 50%-al nagyobb volt mint a múlt évben a kukorica szaporító szakaszai alatt (Augusztustól

Szeptember végéig), ami jelentősen csökkentette a területi veszteségeket a múlt évhez képest. A Mexikói Servicio de Informacion Agralimentaria y Pesquera (SIAP) 2016 December 31-i jelentése alapján, előzetes becslések azt mutatják, hogy körülbelül 141,000 hektár megkárosodott míg a múlt évben ugyabannan az időben pedig 432,000 hektár. Továbbá, a földművesek több területet beültettek kukoricával mint sorghum-al a "cukornád levéltetű" tartó előfordulása következtében mely kihatással van a sorghum-ra. Ennek eredményeként a vártnál magasabb beültetett területet sikerült megvalósítani, leginkább Guanajuato-ban ahol körülbelül 18%-al több kukorica lett elültetve.

A tavasz/nyár szezon aratása csaknem be van fejezve. A tavasz/nyár-i kukorica a teljes kukorica termelés körülbelül 75%-át teszi. Az ősztél-i termés fejlődésének, mely főleg öntözött, jól tett a víztároló szintje mely megfelelő volt és a kedvező időjárási körülmények is. Az ősztél szezon aratása Májusban kezdődik.

Kukorica Ukrajnában: az Állami Sztatisztikai Hivatal rekord hozamról számolt be


Ukrajna 2016/17 kukorica termelését 28,0 millió tonnára becsülték, 1,0 millióval növekedett a múlt hónapi prognózishoz képest és 4,7 millióval több mint a múlt évi szárazság miatt csökkentett termés. Az idei termés 2,9 millió tonnával van a 2013/14 –es évi rekord alatt, mikor a vetés terület is a rekord szinten volt. A hónapról hónapra történő növekedés az előzetes aratási adatokon alapszik melyeket Ukrajna Állami Statisztikai Bizottsága ad ki (SSC-State Statistical Committee).



USDA a hozamot felbecsülte 6,59 tonnára hektáronként, ami 4%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 15%-os növekedés a múlt évhez képest, és 2%-al meghaladja a 2011/12 éves rekordot. Betakarított terület változatlan marad - 4,25 millió hektár. A tartós esős időjárás jelentősen késleltette az idei

kukorica betakarítását és a helyi árú jellemzők jelentései szerint egyes földművesek a kukorica valamenyi részét a mezőn szándékozzák hagyni és inkább a napraforgómag aratására akarnak összpontosítani. Az SSC adatok azonban azt mutatják, hogy a 4,29 millió hektár kukoricával beültetett terület 99%-át betakarították.

Kukorica Brazíliában: kukorica első-termésének aratása folyamatban van




Brazília 2016/17 kukorica termelését 86,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami változatlan a múlt hónapi prognózisokhoz képest, de növekedett 19,5 mmt-al a múlt évhez képest. Betakarított területet 16,7 millió hektárra becsülték, ami 0,7 millió növekedés a múlt évhez képest. Hozamot felbecsülték 5,18 metrikus tonnára hektáronként ami átlag feletti, és 24%-al nagyobb mint a múlt évi termés, mely a vártnál korábban befejeződött esőzésektől károkat szenvedett a második termés növekedési időszaka alatt.

Az idei első-termésnek az általában kedvező termesztési feltételek jót tettek. A normalizált növényzet eltérési indexe (NDVI-normalized difference vegetation index) átlagos és átlagon felülinek mutatta a növényzet egészségét Parana-ban és mindenütt ahol az első-termést növesztik. Brazília Mezőgazdasági Minisztériuma, CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), becslése szerint az első terméshozam 7%-al nagyobb lesz mint a múlt évben. Az aratás folyamatban van a központi, déli régiókban és észak Brazília egyes részein. Időszerűen esős időjárási jelentések ellenére is az aratás átlagos és átlagon felüli irammal halad, melyek korlátozzák a munkát a mezőkön. A második kukorica termés ültetése Januárban kezdődött a szójabab aratása után. Az idei szójababot gyorsabb ütemben ültették mint tavaly, a korábban vetett rövid időszakú szójabab aratása pedig folyamatban van. A korábbi szójabab aratás

lehetővé teszi a második kukorica termés korábbi ültetését ami Március végéig tart a Közép-Nyugati régióban és Májuson keresztül más helyeken.

Búza és árpa Kazahsztánban: nyilvánosságra hozták az előzetes betakarítási adatokat

USDA Kazahsztán 2016/17 évi búza termelésének prognózisát 9%-al csökkentette a múlt hónapi előrejelzéshez képest míg az árpa termelésére vonatkozó prognózist rekord szintig növelte. Mindkét változás az előzetes betakarítási adatokon alapszik melyeket Február elején nyilvánosságra hozott a Kazahsztáni Állami Statisztikai Hivatal (SSA). Búza termelését 15,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték fel, ami 16,5 mmt volt a múlt hónapban és 13,7 mmt volt a múlt évben. Árpa termelését 3,2 mmt becsülték fel mely 2,7 mmt volt a múlt hónapban és 2,7 mmt volt tavaly. Mindkét termés hónapról hónapra történő változása a hozam becslésének változásai miatt fordultak elő: 12%-os csökkenés a búzának és 17%-os növekvés az árpának.




A Mezőgazdasági Minisztériumtól kapott adatok melyek az aratás folyamatára vonatkoznak magasabb teljes szemtermésmennyiséget mutattak mint amit később az SSA jelentett. A Minisztérium által kiadott napi adatok a betakarítás folyamata alatt a teljes szemtermésmennyiség hozam 14%-os növekedését mutatták ki a múlt évhez képest. Átlagban, a búza hozama melyet Februárban nyilvánosságra hoz az SSA körülbelül 6%-al alacsonyabb mint a teljes szemtermésmennyiség hozama melyet a Minisztérium hoz nyilvánosságra Október végén mikor az aratás befejeződik. (a búza Kazahsztán összes gabona területének 80-85%-át képezi) Idén azonban az SSA szerinti hozam adatok 14%-al alacsonyabbak voltak a Minisztérium adataitól.

Ráadásul, a szokásos különbségek az egyéni búza és árpa hozama között ebben az évadban nagyobbak

lettek a regionális hozam különbségek miatt. Kazahsztán árpa hozama általában magasabb a búza hozamától átlagban 15%-al az elmúlt tíz évben, de 2016/17-es év árpa hozama meghaladta a búza hozamát az SSA szerint 41%-al. Észak-közép Kazahsztánban ahol csaknem 80%-a az idei búzának és körülbelül fele az árpának van termelve, búza hozama 3%-al csökkent a múlt évhez képest míg az árpa hozama 27%-al növekedett. Délkelet Kazahsztánban mely az árpa terlmelésének 35%-át képezi, az árpa hozama 29%-al növekedett. Bár a búza hozama Délkelet Kazahsztánban 20%-al növekedett a múlt évhez képest, ez a régió az ország búzájának csak 11%-át képezi.

Szójabab Argentínában: nagy esőzések csökkentik a vetésterületet



Nagy esőzések December végétől Január végéig a fő termőterületeken árvizeket okoztak ami néhány szójabab terület vesztességéhez vezetett, azonban 80%-a az argentin szójának kedvező körülményekben van. Argentína 2016/17 szójabab termelését 55,5 millió metrikus tonnára prognosztálták, ami 3%-al alacsonyabb a múlt hónaphoz képest és 2%-al alacsonyabb a múlt évhez képest. Betakarított területet 19 millió hektárra becsülték, ami 0,45 millió hektárral kevesebb vagyis 2%-al a múlt hónaphoz képest. Hozamot felbecsülték 2,92 metrikus tonnára hektáronként, ami gyakorlatilag nem változott. Az esőzések továbbra is pótolják a talaj nedvességtartalmát Buenos Aires déli tartományában ahol korábban szárazság volt. Az ültetés be van fejezve, több mint 43%-a a termésnek virágzik, 47%-a a termésnek pedig hüvelyt fejleszt. Szójabab első termése 80%-át teszi ki az Argentin szójának, szójabab második termése (melyet a búza aratása után ültetnek) pedig a maradékot képezi.

