


MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

EU búza: a tavalyi Francia búzaveszteség után a 2017/18 termelés helyreáll




Európai Unió (EU) 2017/18 év búza termelését 151,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte fel, növekedett 5,5 mmt vagy 4%-al a múlt évhez képest és 2,7 mmt vagy 2%-al lesz az ötéves átlag felett. Betakarított területet 26,5 millió hektárra (mha) becsülték fel, ami 0,7 mha csökkent vagy 3%-al a múlt évhez képest, de ugyanaz mint az ötéves átlag. Hozamot 5,70 tonnára hektáronként becsülték, ami 7%-os növekedés a múlt évhez képest és 2%-al van az ötéves átlag felett.

Búzafeltételek az EU-ban jók, megfelelő talajnedvességgel. A műholdas képek átlag feletti feltételeket mutatnak EU legtöbb részén. Viszont, a legproblémásabb terület Spanyolország, Castilla y Leon az északi gabonatermelő régióban szárazság uralkodott és Dél-Spanyolország durumtermelő régiójában Andalucia-ban pedig nagy eső esett ahol az aratás folyamatban van.


Franciaország (EU legnagyobb búzatermelője) a kedvezőtlen szárazság ellenére is, 10 millió tonna nyereséget vár a tavalyi nagyon alacsony termés után. Közép-Európában és a Balkánon, lokalizált téli fagyok várhatóan csökkentik a termelést.

Búza Ukrajnában: talaj bőséges nedvességtartalma támogatja az átlagot meghaladó hozamot 2017/18-re



Ukrajnának a 2017/18 év búza termelését 25,0 metrikus tonnára becsülték fel, ami 1,8 millió csökkenés a múlt évhez képest, betakarított területett 6,6 millió hektárra becsülték összehasonlítva 6,5 millióval az előző évhez képest. Habár az őszi szárazság késleltette a téli-búza ültetését és csökkentette a termés fejlődéséhez rendelkezésre álló időt, a szokatlanul mély hótakaró olvadása teljesen pótolta az altalaj nedvességtartalmát és jót tett a téli termésnek miközben azok folytatták a tavaszi növekedést. A talaj nedvességének növelése mellett, a hótakaró védte a téli termést fagykárosodás ellen. Az Állami Statisztikai Bizottság becslése szerint az idei téli termés veszteségei minimálisak lesznek. Hozamot 3,79 tonnára hektáronként becsülték fel, ami 9%-al van a múlt évi rekord alatt de 5%-al van az ötéves átlag felett. A búzát az ország egész területén termesztik, de a fő termelési régiók közép, dél és kelet Ukrajnában vannak. Búza aratása Június végén vagy Július elején kezdődik és Augusztus végéig tart. Az összes USDA Ukrajna termésének termelésére vonatkozó becslések tartalmazzák a felbecsült termelést Krímből.

Búza Indiában: 2017/18 termelését rekord szintre becsülték fel




USDA a 2017/18 évre India búza termelését 97,0 millió metrikus tonnára becsülte, ami 11%-os növekedés a múlt évhez képest. A növekedés a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetőek, növelve a hozamot a fő búza termelő területeken. Betakarított területet 31,8 millió hektárra becsülték fel, ami 5%-os növekedés a múlt évhez képest. A művelt terület növekedése az erős hazai áraknak köszönhető, melyek a szoros hazai készletek miatt vannak. Uttar Pradesh és Madhya Pradesh államokban, melyek India teljes búzatermelésének körülbelül 50%-át képezik, a tavalyi évhez képest kibővítették a beültetett területet 6 és 14%-al.

A búza aratása befejeződött Punjab, Haryana, Pradesh, Rajasthan, Gujarat és Uttar Pradesh államokban. Az aratás Május 1-én még mindig fojamatban volt Bihar és Nyugat Bengál-ban. Punjab, Haryana és Uttar Pradesh-ban az aratást megelőző magas hőmérsékletek valószínűleg nem lesznek nagy hatással a hozamra mert a termés már átment a fejlődés érzékeny szakaszain. Korai vetésterületekről melyek Gujarat, Madhya Pradesh és Rajasthan államokban vannak, átlag feletti hozamokról jelentettek. A legelső aratási jelentések Uttar Pradesh, Haryana és Punjab-ban azt jelzik, hogy a búza hozama magasabb mint az elmúlt két évben.

Búza Oroszországban: 2017/18 termelés 8%-al csökken, de második legmagasabb mely fel van jegyezve

Oroszország 2017/18 év búza termelését 67,0 millió metrikus tonnára becsülték fel, ami 5,5 millió csökkenés a múlt évi rekord termeléshez képest. Az évről évre történő csökkenés ellenére is az előrelátott termelés a második legnagyobb búza betakarítás lenne. Betakarított területet 27,5 millió hektárra becsülték, növekedés 0,5 millió hektárral a múlt évhez képest. Hozamot 2,44 tonnára hektáronként becsülték, mely 9%-al van a múlt évi rekord alatt de 5%-al van az öt éves átlag felett. Az összes USDA Oroszország termésének termelésére vonatkozó becslések nem tartalmazzák a felbecsült

termelést Krímből.



Oroszország Mezőgazdasági Minisztériumának jelentése szerint az őszi vetésű téli gabona területe több mint 6%-al növekedett az elmúlt szezonban. Búza Oroszország téli gabona területének körülbelül 85%-át képezi, téli búza az ország teljes búza területének felét képezi. Téli gabona veszteségei az őszi szárazságtól és a téli fagyoktól minimális volt, a jelenlegi talaj alatti nedvességtartalékok általában kedvezőek a téli mély hótakaró után. Téli búza aratása Június végén vagy Július elején kezdődik dél Oroszországban és nagyrészt befejeződik Augusztus végéig az északi termelési régiókban.


Május 4-től a tavaszi búza vetése folyamatban volt a főbb régiókban (beleértve a Volga, Urál és a Szibériai Körzeteket). Az ültetés folytatódni fog Június elejéig.

Mezőgazdasági Minisztérium szerint a tavaszi búza végső vetésterülete 13,6 millió hektár lesz, ami 3%-os növekedés a múlt évhez képest. Az időjárástól függően a termesztés és aratás ideje alatt, a bevetett terület egy része nem lesz betakarítva. Rosstat (Oroszország állami statisztikai hivatal) adatai szerint egy tipikus évben 2-10%-át a búzának mely a fő tavaszi búza régióban ültetnek nem gyűjtik be. Átlagban, a tavaszi búza hozama Oroszországban csak körülbelül a fele a téli búza hozamának.

EU repce: szárazság és fagykárosodás ellenére is kedvező feltételek 2017/18-ra

Európai Unió (EU) repce termelését 21,3 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték fel, ez 0,9 mmt vagy 4%-os csökkenés a múlt évhez képest és 0,3 mmt vagy 1%-al van az öt éves átlag alatt. Betakarított területet 6,6 millió hektárra (mha) becsülték, ami 0,7 mha vagy 1%-os növekedés a múlt évhez képest és hasonló az öt éves átlaghoz. Hozamot 3,23 tonárra hektáronként (t/ha) becsülték, 4%-os növekedés a


2016/17-es évi terméstől mely 3,12 t/ha volt, de 2%-al van az öt éves átlag alatt.



Míg a műholdból eredő növényzet képei megerősítik a jó feltételeket EU nagy részén, a legnagyobb repce termelő területeken észrevehető a szárazság hatása a vegetációra, különösen Franciaországban. Franciaország (EU második legnagyobb repce termelője) északi és észak-keleti repce övezete átlag alatti csapadék mennyiséget kapot, ami lecsökkentette a termelésre vonatkozó prognózist 4,5 mmt-ra, összehasonlítva az 5,1 mmt öt éves átlaggal.

Repce termelése Németországban (mely EU legnagyobb repce termelője), becslések szerint a tavalyi időjárás miatt csökkent termés után megnövekszik 0,5 mmt-től 5,1 mmt-ig. A megnövekedett terület és a magasabb hozamok miatt a termés Lengyelországban is megnövekszik 0,5 mmt. Szinte minden országban folytatódik a neonikotinoid rovarirtó tilalma, ami csökkenti az ültetést és növeli a növények sebezhetőségét kártevők és betegségek által. Románia megkapta a neonikotinoid tilalom alóli kivételt, ezért várható, hogy tovább növelje a vetés területet, termelést pedig 1,7 mmt-ra becslik. A fagykárosodás valószínűleg számos közép európai országban csökkenti a művelt területet, beleértve Németországot, Magyarországot és Litvániát.


Repce Kanadában: 2017/18 várható, hogy a művelt terület rekord szintig növekszik



Termelést rekord 21,0 millió metrikus tonnára becsülik, ami 14%-os növekedés 2016/17-hez képest. Hozamot 2,20 metrikus tonnára hektáronként prognosztálták. Kanadai Statisztika kiadta 2017 évre vonatkozó ültetési terveit. Az elmúlt években, az ültetési szándékok alacsonyabbak voltak mint a Kanadai Statisztika által jelentett végső ültetett terület. USDA a 2017/18 évre a betakarított területet rekord 9,5 millió hektárra becsülte fel, ami 16%-os növekedés a múlt évhez képest. Az évről évre történő növekedés az ültetési tervek növekedését tükrözi. A növekedés a repce nagyobb hozama miatt van a többi szántóföldi növényekhez képest.

Október 2016 folyamán egy várhatatlan havazás miatt a Kanadai Prériákban (ahol a legtöbb repcét termelik), számos földművesnek el kellett végezni a tavalyi termés aratását az ültetés előtt. Munka a mezőkön folyamatban van, megkönnyítve a szárazabb időjárást.


Búza Ausztráliában: 2017/18 termelés 29 százalékkal csökken



Búza termelését 2017/18 –ra 25,0 millió metrikus tonnára becsülték, ami 10,0 millió vagy 29%-os csökkenés a múlt évhez képest. A nagy évről évre történő csökkenés a hozamokra vonatkozó elvárásokon alapul, amelyek átlagosabb szintre térnek vissza. 2016/17-ben a kedvező időjárás minden nagyobb Ausztrál gabona övezetben közel tökéletes körülményeket biztosított a növény fejlődéséhez, reprodukciójához és szem képződéséhez, ami 2,71 tonna hektáronkénti rekord hozamot eredményezett. Hozamot 1,95 tonna hektárra becsülték, 76%-al van az elmúlt év alatt. Beültetett területet 12,8 millió hektárra becsülték, 0,1 millióval van az elmúlt év alatt. Bőséges csapadék után a legtöbb termelő területeken a jelenlegi körülmények kedvezőek Dél Ausztráliában és Victoria-ban. Nyugat Ausztrália és New South Wales részeinek pedig további csapadékra lenne szükségük.

Búza Ausztrália legnagyobb téli termése, ültetés Április és Július között van. Az aratás közép Queensland-ben kezdődik Augusztusban és déli irányban halad a keleti part mentén Victoria-ig, ahol az aratás be is fejeződik Januárban. A nyugati parton, az aratás Októbertől Január végéig tart. A fő termelő államok Nyugat Ausztrália, New South Wales, Dél Ausztrália, Victoria és Queensland. Nyugat Ausztrália rendszerint a kivitelt több mint 40%-át képezi, míg a keleti part búza termésének nagyobb részét belföldi fogyasztásra használják.


Szójabab Brazíliában: rekord termés 2016/17-re



Brazíliának a 2016/17 évi szójabab termelését rekord 111,6 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, növekedés 0,6 mmt a múlt hónapi prognózistól és 15,1 mmt növekedés a múlt évhez képest. Betakarított területet rekord 34 millió hektárra (mha) becsülték fel, változatlan a múlt hónaphoz képest és 0,7 mha növekedett a múlt évhez képest. Hozamot rekord 3,28 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 1%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 13%-os növekedés a múlt évhez képest. Szójabab aratása az ország legtöbb részén befejezéshez közeledik és jelentések a betakarításról a hozamok havi növekedését jelzik Közép-Nyugati, Déli és Északi régiókban. A rekord szójabab termés hozam potenciálját a jobb minőségű vetőmag fajták kombinációjával, jobb növénygazdálkodási gyakorlattal érték el és nagyon kedvező időjárás is segített.

Kukorica Brazíliában: 2016/17 a rekord termelést még magasabbra becsülték fel


Brazília 2016/17 évi kukorica termelését rekord 96,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték fel, ami 2,5 mmt növekedés a múlt hónaphoz képest és 43%-al növekedett a múlt évhez képest. Betakarított területet rekord 17,5 millió hektárra (mha) becsülték, összehasonlítva a múlt hónapi 17,3 mha-al és 16,0 mha a múlt évben. Művelt terület 9%-al növekedett a múlt évhez képest, második kukorica termése pedig a teljes terület kétharmadát képezi. Hozamot rekord 5,49 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ez 2%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 31%-os növekedés a múlt évhez képest.



A tavalyi alacsony terméshozam a száraz időjárás miatt következett be, amely súlyosan befojásolta a második termés hozamát. Brazíliának 2 kukoricatermesztési szezonja van. Kukorica első termését Szeptemberben ültetik és Márciusban van az aratása. A nagyobb második évszak kukoricáját a korai szezonu szójabab betakarítása után ültetik, Januártól Márciusig.

Az első terméshozam eredményei magasabb hozambecsléseket jeleznek a múlt hónaphoz képest a déli államok számára, jó idő és kedvező termesztési feltételek alapján. A második termés ültetése Januárban kezdődött és Júniusig folytatódik. Második termés területét és hozamát magasabbra becsülték Mato Grosso és Parana-ban ahol az időjárás eddig kedvező volt. Ezekben az államokban és a második kukorica termesztési területein Mato Grosso do Sul és dél Goias-ban a vegetáció egészsége átlag felett van. Észak-kelet Goias, észak Minas Gerais és északkeleti régiók részein, csapadék a normál értékek alatt volt, csökkentve a talaj nedvességet mely a termés fejlődéséhez szükséges. Második termés aratása Júniusban kezdődik.

Kukorica Kínában: 2017/18 a termelés a tavalyi évhez képest csökken



USDA a 2017/18 évre Kína kukorica termelését 215,0 millió metrikus tonnára becsülte fel, csökkent 4,6 millióval vagy 2%-al csökkent a múlt évhez képest és közel 1%-al csökkent az öt éves átlagtól. Betakarított területet 35,0 millió hektárra becsülték, ami 1,8 millió csökkenés vagy 5%-os csökkenés a múlt évhez képest és csak a második egymást követő terület csökkenése 2003 óta. Hozamot rekord 6,14 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 3%-os növekedés a múlt évhez képest. Az ültetés Májusban van.