


MEZŐGAZDASÁGI TERMEELÉS A VILÁGON

Búza Oroszországban: betakarítási becslés tovább emelkedik



Kép. Búza Oroszországban: becsült terület, hozam és termelés

USDA a 2017/18 évre Oroszország búza termelését 81,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 3,5 mmt emelkedés a múlt hónaphoz képest és meghaladta a tavalyi rekord teljesítményt 8,5 mmt-al. A havi növekedés elsősorban a Mezőgazdasági Minisztérium betakarítási adatain alapszik mely rekord téli búza hozamokat idéz Dél, Észak Kaukázus, Közép és Volga körzetében. Magas korai hozamok a tavaszi búza övezetben (beleértve a Szibériai, Urál és Volga körzeteket) megerősítik a korábbi előrejelzéseket amelyek műholdas képeken alapultak és kiemelkedő feltételeket és nagy potenciális hozamokat jeleztek az ország tavaszi búza övezetére.

USDA a hozamot 3,02 tonnára hektáronként becsülte, ami 5%-os növekedés a múlt hónaphoz képest, 13%-os növekedés a múlt évhez képest és 31%-al van az öt éves átlag felett. Szeptember 6-án bezárva Oroszország búza aratásának 70% van befejezve, Minisztérium jelentése szerint a Déli és Észak Kaukázus körzetek hozama felülmúlta a múlt évi rekord szintet 5 és 4 százalékkal. Az aratás mindkét körzetben befejeződött. A jelentett hozam a Közép körzetben 20%-al magasabb a múlt évhez képest, Volga körzet hozama több mint 30%-al magasabb a múlt évhez képest. A begyűjtött búza nagy része eddig téli búza


volt, mely Oroszország búza termelésének körülbelül 70%-át képezi. Tavaszi búza aratása Augusztus közepe felé kezdődött és Október végéig tart. USDA termelés becslései nem tartalmazzák Krím termelését mely nagyjából 1,0 mmt.

Búza Törökországban: termés rekord szintre tér vissza

USDA a 2017/18 évre Törökország búza termelését 20,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 3%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 16%-os növekedés a múlt évhez képest. Betakarított területet 7,8 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz és múlt évhez képest. Az Anatóliai fennsíkon tartó őszi szárazság késleltette a téli búza vetését és csökkentette a növény fejlődésének rendelkezésére álló időt. Kedvező hótakaró megvédte a téli termést a fagykárosodástól és pótolta a talaj nedvesség tartalmát ami jól jött a termésnek mikor folytatta tavaszi növekedését. Amikor a növekedés folytatódott, téli búza fejlődése 2-3 héttel késett. Április elejétől Július végéig az időjárás kedvező volt és lehetővé tette a termésnek, hogy pótolja a fejlődés korai késését. Hozamot 2,56 tonnára hektáronként becsülték, ami 3%-al több a múlt hónaphoz képest és 16%-al több a múlt évhez képest. Az aratás valószínűleg Szeptember elejéig befejeződött.

Repcé Kanadában: vetésterület csökkenése hivatalos adatokon alapszik

USDA a 2017/18 évre Kanada repce termelését 19,9 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 3%-al csökkent a múlt hónaphoz képest. Vetésterületet 9,2 millió hektárra becsülték, ami 3%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest. A csökkenés Kanada Statisztikai adatain alapszik melyek kevesebb vetésterületet jeleznek a repcére.




Kép. Saskatchewan, Kanada: a betakarítás előrehaladása (minden termés)

Betakarítás Augusztus elején kezdődött és általában Október végéig befejeződik (a tavalyi év kivételével mikor a betakarítás késet a váratlan havazás miatt). Saskatchewan-ban, ahol a repce termelésének körülbelül fele történik, betakarítás 26% van befejezve és Alberta mely 35%-át képezi a repce termelésének, betakarítás 16% van befejezve. A betakarítás folyamatban van Manitoba tartományban is. Repcét általában bekötik és kiteszik száradni a cséplés előtt. Ezen a ponton a szezonban, a száraz időjárás kedvező lesz a szárításra és a betakarításra.

Napraforgó Argentínában: magas belföldi kereslet az olaj iránt növeli a vetésterületet

Argentína 2017/18 évi napraforgó termelését 4,0 millió metrikus tonnára becsülték, 18%-al növekedett a múlt hónaphoz képest és 18%-al növekedett a múlt évhez képest. Vetésterületet 1,9 millió hektárra becsülték, 19%-al több a múlt hónaphoz képest és 11%-al magasabb a múlt évhez képest. Az előrelátott hozam 2,11 tonna hektáronként kissé a múlt hónap alatt van de 6%-al magasabb a múlt évi hozamhoz képest. Ebben a szezonban a vetés gyorsan indult, főleg észak Argentínában. A fő termelési régiókban várható a területnövekedése és a megnövekedett belföldi kereslet a napraforgó olaj iránt valamint a kiviteli adó hiánya mind a termés mind a feldolgozott olaj esetében a földműveseket napraforgó ültetésére ösztönözte.



Kép. Napraforgó Argentínában: becsült terület, hozam és termelés

Kukorica Szerbiában: a hő és a szárazság 2,6 millió tonnával csökkenti a termelést

USDA a 2017/18 évre Szerbia kukorica termelését 4,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, mely 39%-al csökkent a múlt hónaphoz képest, 47%-al csökkent a múlt évhez képest és 35%-al kevesebb az öt


éves átlagtól. Vetésterületet 1,0 millió hektárra becsülték, 0,1 millióval csökkent a múlt hónaphoz képest és kissé a tavalyi év alatt van. Hozamot 4,0 tonnára hektáronként becsülték, mely 33%-al csökken a múlt hónaphoz képest, 46%-al csökkent a múlt évi rekord hozamhoz képest és 28%-al van az öt éves átlag alatt.

Korai várakozások még egy rekord termésre voltak a 2016/17 rekord hozam és közel rekord termelés után. Azonban, súlyos aszály és túlzott forróság Július és Augusztus folyamán 40 C feletti hőmérsékletekkel, a reprodukció és mag fejlődése alatt nagymértékben csökkentette a termést. Ez a kedvezőtlen időjárás magába foglalta az egész Pannon-medencét – amely magába foglalja az alföldeket Magyarországon, nyugat Romániában és észak Horvátországban – de a Szerb termést különösen súlytotta, Vajdaság elsődleges termesztési régiója a rossz körülmények középpontjában volt. Szerbiában a kukorica hozama az esőzésektől függ, mivel a termés kevesebb mint 10%-a öntözött.

Augusztus vége felé, USDA mezőgazdasági szakemberei a Belgrádi képviselőből elutaztak Vajdaságba, hogy ellenőrizzék a mezőkön levő körülményeket. Ebben az északi régióban vannak Szerbia legnagyobb és legjobb gazdaságai. Augusztusban a termés körülményei rendkívül gyengék voltak. A magas hőmérsékletek miatt, a termés fejlődési időszaka felgyorsult és az aratás Augusztus végén megkezdődött, egy hónappal a szokásos előtt. A növények rövidek voltak. Egyes mezőkön a növényeken nem volt termés, ami a betakarított terület csökkenését eredményezte. Más mezőkön a növényeken csak kis termés volt. Penész és féreg károsodásról is jelentettek, a növény nedvessége nagyon alacsony volt 11,4%, a szokásos 16-20% helyett. Aggodalmak is jelentkeznek a lehetséges aflatoxin-problémákról.


Kukorica Argentínában: megnövekedett vetésterület növeli a termelés előrejelzését

USDA a 2017/18 évre Argentína kukorica termelését 42,0 millió metrikus tonnára becsülte, 5%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 2%-os növekedés a múlt évhez képest. Területet 5,2 millió hektárra becsülték, 6%-al több a múlt hónaphoz képest és 6%-al magasabb a múlt évhez képest. A prognózált hozam 8,08 tonna hektáronként 1%-al alacsonyabb a múlt hónaphoz képest és 3%-al van a tavalyi hozam alatt. A nedves talaj késleltetheti a késő Szeptemberi és Októberi korai kukorica vetését Cordoba-ban, Buenos Aires-ben, La Pampa-ban és Santa Fe-ben. Ha az esőzések folytatódnak a fő vetésterületeken, később ültetett kukorica képezheti a termés nagyobb részét ebben a szezonban. Néhány területen várhatóan kukoricát ültetnek egy korábbi kukorica termés után, itt jó gazdálkodásra valamint a műtrágyák gondos kiválasztására és a kártevők kezelésére szolgáló vegyi anyagokra lesz szükség.



Kukorica Oroszországban: az előrejelzett termelés le lett csökkentve a forró és a száraz időjárási körülmények után melyek az ország Déli részén voltak

USDA a 2017/18 évre Oroszország kukorica termelését 16,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,5 mmt csökkenés a múlt hónaphoz képest de felülmúlta a múlt évi rekord termelést 0,7 mmt-al. Az előrejelzett hozamot 3%-al csökkentették a forró és száraz időjárási körülmények miatt melyek dél Oroszországban voltak ahol az ország fontos kukorica termelési területei vannak. Betakarított területet rekord 3,0 millió hektárra becsülték a tavalyi 2,8 millióval szemben. Oroszország kukorica területe az elmúlt 7 évben több mint kétszeresére növekedett, a terjeszkedés nagymértékben a Központi Kerületben történt, amely az ország legnagyobb kukoricatermelő régiójává vált.




Kép. Kukorica Oroszországban: becsült hozam és termelés

Árpa Oroszországban: rekord hozam ellensúlyozza a kisebb területet


USDA a 2017/18 évi Oroszország árpa termelését 20,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 2,0 mmt-al növekedett a múlt hónaphoz képest és 3,0 mmt-al növekedett a múlt évhez képest. Növekedés a Mezőgazdasági Minisztérium adatain alapszik. Szeptember 6-ai az aratás 80% van befejezve, a jelentett hozam 21%-al van az előző év azonos időszakában elért hozam felett, „bunker” súly (a tisztítás és szárítás előtti súly) termelési eredménye közel 18,0 millió tonna. Végző nettó tömeg körülbelül 6%-al kevesebb mint a „bunker” súly. Hozamot rekord 2,59 tonnára hektáronként becsülték, ami 11%-os növekedés a múlt hónaphoz képest, 18%-os növekedés a múlt évhez képest és 25%-al van az öt éves átlag felett. USDA termelés becslése nem tartalmazza Krím termelését amely körülbelül 0,6 mmt.

USDA a betakarított területet 2017/18 évre 7,9 millió hektárra becsülte, enyhén csökkent a múlt évhez képest és a legalacsonyabb az utolsó négy év alatt. Az árpát Oroszország minden mezőgazdasági régiójában termesztik.



Kép. Árpa Oroszországban: becsült terület, hozam és termelés

Kukorica Ukrajnában: a rövid ideig tartó csapadéknak Júliusban nem sikerült megnövelni a hozam kilátásait



Kép: Ukrajna és környező régiók, felszín alatti nedvesség, Augusztus 11-20, 2017

USDA a 2017/18 évre Ukrajna kukorica termelését 27,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, csökkent 1,0 mmt-al a múlt hónaphoz képest de 0,5 mmt-al van a múlt évi termelés felett. Betakarított terület változatlan 4,5 millió hektár, kissé növekedett a múlt évhez képest. Becsült hozamot lecsökkentették 6,11 metrikus tonnára hektáronként, 4%-al csökkent a múlt hónaphoz képest, 7%-al csökkent a múlt évhez képest de 3%-al van az öt éves átlag felett.

A növény fejlődési időszaka alatt szárazság uralkodott a fő kukoricát termelő régióban. A termésnek jót tett az időbeni eső Július vége felé, de ezt követte a kedvezőtlen száraz időjárás visszatérése. Kukorica aratása folyamatban van dél Ukrajnában, de a beültetett területnek kevesebb mint 1% lett betakarítva Szeptember 6-ig.