


MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Szójabab Argentínában: termés több mint 90%-a el van ültetve, korai termés pedig virágzik




Kép. Argentína: talajnedvesség százaléka

Argentínának a 2017/18 évi szójabab termelését 56 millió metrikus tonnára becsülték, ami 2%-al kevesebb a múlt hónaphoz képest és 3%-al van a múlt évi termelés alatt. Vetésterületet 18,7 millió hektárra becsülték, ami 2%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest de 2%-os növekedés 2016/17 óta. Hozamok várhatóan kedvezőek lesznek, 2,99 tonna hektáronként átlagolva, kissé növekedett a múlt hónaphoz képest de csökkent 5%-al a múlt évhez képest. Korlátozott esőzések December közepén és végén késleltették az ültetést. Januári csapadék fogja elhatározni, hogy ültethető lesz-e második termésű szójabab vagy későn ültetett első termésű szójabab mivel az észak argentinai földművesek további esőzéseket várnak mely pótolná a talaj nedvességtartalmát.

Lassú ültetés ellenére is a termésviszonyok átlagosnak és átlag felettinek tűnnek, csak néhány késői vetés maradt Salta, Chaco, Santiago del Estero és Formosa tartományokban és néhány második termés szójabab vetése Buenos Airesben. A kormány egy 0,5%-os csökkentést jelentett be a szójabab kiviteli


ának 2017/18 évi szójabab termelését 110 millió metrikus tonnára becsülték, ami 2%-

[illegible]

bab termés korai fejlődésének kezdeti késleltetése (késő ültetés miatt a tavalyi évhez képest)


amán több szójabab termőterületre vonatkozóan. A későbbi termésfejlődés az NDVI szerint a szójabab fejlődésének megfelelően halad és a vegetáció egészsége általában átlagon felüli. Továbbra is megfigyelhető a szójabab fejlődésének későbbi szakaszai, amelyek a kilátások a szójabab termésére vonatkozólag. Nemrég megkezdődött a betakarítás Magyarországon, ahol átlagos hozamról számoltak be. A betakarítás az egész országban júniusig tart.

Búza Pakisztánban: rekord termelés és hozam




USDA (Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma) a 2017/18 évre Pakisztán búza termelését rekord 26,5 millió metrikus tonnára becsülte (mmt), ami 0,8 mmt növekedés a múlt hónaphoz képest és 0,9 mmt vagy 4%-os növekedés a múlt évi termeléshez képest. Vetésterületet 9,05 millió hektárra (mha) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 0,15 mha vagy 2%-os csökkenés múlt évhez képest. Ezek a számok összhangban vannak Pakisztán kormányának legfrisebb becsléseivel. E hónap felülvizsgálata elsősorban a USDA FAS (Foreign Agriculture Service Office of Agricultural Affairs – Külföldi Mezőgazdasági Szolgáltatás Mezőgazdasági Ügyek Hivatala) közelmúltban tett észrevételein és jelentésein alapszik - Iszlámabad, Pakisztánban.

A 2,93 tonna hektáronkénti rekord hozam 3%-al magasabb mint az előző rekord mely 2014/15-ben volt. A magasabb hozamot a pozitív szezonális feltételeknek, megfelelő víznek az öntözéshez, jó gazdálkodási gyakorlatoknak és a műtrágyák és herbicidek fokozott alkalmazásához tulajdonították. Punjab búza területének nagyobb része bőséges csapadékot kapott Januárban a februári virágzás előtt. Műholdról eredő vegetációs indexek értéke meghaladja az átlagos körülményeket Punjab (77%-át képezi a teljes búzatermelésnek) és Sindh (15%) államokban. Északnyugati határmenti tartomány (5%) és Baluchistan (3%), viszont átlagos termés körülményeket mutatnak.



Búza Oroszországban: rekord termelés 85 millió tonnával

Oroszország 2017/18 év búza termelését 85,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 2,0 mmt növekedés a múlt hónaphoz képest és felülmúlja a múlt évi rekordot 12,5 mmt-el. Havi növekedés a Rosstat (Oroszország Állami Statisztikai Ügynöksége) által közzétett előzetes adatain alapszik. USDA becslései nem tartalmazzák Krím termelését. A 3,13 metrikus tonnára becsült hozam 16%-al van a múlt évi rekord felett, a betakarított terület melyet 27,2 millió hektárra becsültek a legnagyobb 1982 óta.




Kép. Orosz búza: becsült hozam és termelés

Ebben az évben a búza termése minden nagyobb termelési régióban kiváló időjárásban részesült. Rekord hozamról jelentettek Dél, Közép, Észak Kaukázus és Volga kerületében, a Szibériai és Urál körzet hozama pedig a második legmagasabb mely fel van jegyezve. A végleges adatokat Márciusban adják ki, de a végső búza termelési adatai ritkán térnek el az előzetes adatoktól.


Kukorica Oroszországban: Rosstat előzetes termelésről jelent

USDA a 2017/18 év Oroszország kukorica termelését 13,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,5 mmt csökkenés a múlt hónaphoz képest és 1,8 mmt csökkenés a múlt évi rekord termeléshez képest. Betakarított terület becslése 2,80 millió hektárról (mha) 2,75 mha-ra csökkent, közel azonos az elmúlt évi szintel. Hozamot 4,91 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 2%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 11%-os csökkenés a múlt évi rekord hozamhoz képest de 5%-al van az 5 éves átlag felett. A felülvizsgálatok részben a Rosstat (Oroszország Állami Statisztikai Ügynöksége) előzetes adatain alapszanak, mely szerint a termelés 12,0 mmt.




Kép. Orosz kukorica: jelentett termelés

Rosstat előzetes vetésterület és kukorica termelési adatai jelentősen különbözhetnek a végleges adatoktól amelyeket Márciusban vagy Áprilisban adnak ki. A jelentett hozamok általában meglehetősen közel vannak, (általában 0,5%-on belül), a magasabb Rosstat termelési adatok inkább a nagyobb jelentett betakarított területhez kapcsolódnak. A különbségek általában magasabbak a késői kukorica betakarítása során mint például 2013,2016 és 2017-ben. 2013-ban Rosstat kukorica termelési száma 0,9 mmt-el volt magasabb mint az előzetes Rosstat szám és 2016-ban pedig 1,5 mmt-el volt magasabb. USDA a végleges Rosstat adatokat használja, amelyek 2018 Márciusában várhatóak a 2017/18-as szezonra.



Kukorica Argentínában: esőzések szükségesek a vetés befejezéséhez Észak Argentínában

Argentína kukorica termelését 2017/18 évre 42 millió metrikus tonnára becsülték, ami 2%-os növekedés a múlt évhez képest és változatlan a múlt hónaphoz képest. Vetésterületet 5,2 millió hektárra becsülték, ami 6%-al több a múlt évi szezonhoz képest és változatlan a múlt hónaphoz képest. Hozamot 8,08 tonnára hektáronként becsülték, ami 3%-al van a múlt évi szezon hozama alatt és változatlan a múlt hónaphoz képest.



Kép. Argentína felszíni talaj nedvessége

További csapadékra van szükség, hogy Észak Argentínában befejezzék a vetést mivel a magas hőmérsékletek talaj nedvesség hiányt okoztak és késleltették a vetés folyamatát.

