

## MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON


### Brazília termései: nyári termés hozamok becslései növekedtek



Nyári szezon alatt kedvező időjárás volt megfelelő csapadékmennyiséggel és napsütéssel, amely jó termesztési feltételeket biztosított a nyári növények számára, kivéve Rio Grande do Sul déli részén ahol szárazság volt. Becslések szerint a szójabab, kukorica, pamut és rizs hozamai átlag felettiak de a tavalyi rekord értékek alatt vannak.

USDA Foreign Agricultural Service (Külföldi Mezőgazdasági Szolgáltatás) személyzete Március közepén Brazíliába utazott, hogy megállapítsák a termés feltételeit. Személyzet beszélt a kereskedőkkel és termelőkkel, és meglátogadtak farmokat Mato Grosso központi régiókban és délkelet Rio Grande do Sul-ban. Szójabab, kukorica első termésének és rizsnek a betakarítása folyamatban van. Jelentett hozamok átlag felett voltak és magasabbak mint ami a nyári termésnél eredetileg várható. Csapadékos időjárási körülmények a szójabab szezon elején és végén minimális hatással volt a szójabab termelésre de aggodalmat keltett a kukorica második termésének késői ültetése miatt. Szárazsággal súlytott dél Rio Grande do Sul-ban viszont gyengén fejlett szójababot észleltek. Kukorica második termésének melyet korábban ültettek kedvező időjárási körülményei voltak. Észak-közép Mato Grosso egyes területein a később ültetett termés fejlődése meg volt fékezve és le volt gyengülve a lokalizált hosszabb ideig tartó szárazság miatt. Kereskedők és termelői szervezetek képviselői idén országszerte átlag feletti szója és kukorica termést várnak a kedvező időjárási és termesztési feltételek miatt.

## Szójabab Brazíliában: rekord termelés várható




Brazília 2017/18 év szójabab termelését rekord 115,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, 2 mmt-al növekedett vagy 2%-al a múlt hónaphoz képest és 0,9 mmt vagy 1%-al növekedett a múlt évhez képest. Betakarított területet 35,0 millió hektárra (mha) becsülték mely változatlan a múlt hónaphoz képest de 1,1 mha vagy 3%-al növekedett a múlt évhez képest. Szójabab hozamát 3,29 metrikus tonnára hektáronként becsülték, 2%-al növekedett a múlt hónaphoz képest de 2%-al csökkent múlt évhez képest. Az országban a termés több mint két harmadát betakarították. Mato Grosso-ban az aratás befejeződött. Az állami kormányzat és ipari források szerint Parana-ban és Rio Grande do Sul-ban az aratás 84 és 20 százaléka van befejezve.




Szárazság dél Rio Grande do Sul-ban csökkentette a hozamot. Szójabab termelése ebben az évben külön lendületet kapott az esőzéseknek köszönve melyek az ország északi és északkeleti régióiban fordultak elő. NDVI (normalizált vegetációs különbségi index) szerint a vegetáció egészsége jó ezekben a régiókban. Ezekből a régiókból származó hozamok várhatóan átlag felettiek lesznek vagy rekord szintet fognak elérni.

## Kukorica Brazíliában: a becsült termelés 7 százalékkal csökkent az előző évhez képest



Brazília 2017/18 év kukorica termelését 92,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, 2,5 mmt vagy 3%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 6,5 mmt vagy 7%-al csökkent a múlt évhez képest. Betakarított területet 17,1 millió hektárra (mha) becsülték, 0,5 mha vagy 3%-al csökkent a múlt hónaphoz és múlt évhez képest. Hozamot 5,38 metrikus tonnára hektáronként becsülték, kissé növekedett a múlt hónaphoz képest de 4%-al csökkent a múlt évhez képest. Első kukorica termés hozama közel van az 5 éves átlaghoz. Az első és második kukorica termésnek a vetésterülete alacsonyabb mivel a termelők inkább a pamutot vagy a szójababot ültették a nagyobb pénzügyi megtérülés miatt. A szójabab késleltetett betakarítása miatt a termelők egy későbbi és kockázatosabb második kukorica termést ültettek vagy egyáltalán nem ültettek semmit. Korai vetés a termésnek több időt biztosít, hogy a szaporodási időszakban szezonális esőzésekben részesüljön. Kukorica első termésének aratása folyamatban van, kukorica második termésének vetése pedig a Közép-Nyugat és Déli régiókban befejeződött (94% második kukorica termelése). Kukorica második termésének betakarítása Júniustól Szeptemberig tart.




## Kukorica Dél Afrikában: bőséges Februári és Márciusi esőzések javították a termés kilátásait



Dél Afrika 2017/18 év kukorica termelését 13,2 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, 0,2 mmt vagy 2%-al növekedett a múlt hónaphoz képest de 4,4 mmt vagy 25%-al csökkent a tavalyi terméshez képest és 0,5 mmt vagy 4%-al növekedett az 5 éves átlaghoz képest. Vetésterületet 2,7 millió hektárra (mha) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 0,3 mha-al csökkent a múlt évhez képest. Hozamot 4,89 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 2%-os növekedés a múlt hónaphoz képest de 17%-al csökkent a múlt évi rekord hozamhoz képest.

A tervezet 2017/18 hozam a második legnagyobb mely fel van jegyezve, bőséges csapadéknak köszönve a kritikus beporzás és mag fejlődés szakasza alatt Január 20-tól Március végéig. Az öntözött kukorica betakarítása már megkezdődött és az esővízzel termesztett termés aratása viszont Áprilisban fog kezdődni és Szeptemberig tart.

### **Kukorica Argentínában: a folyamatos aszály csökkenti a hozam elvárásait**



Argentína 2017/18 év kukorica termelését 33,0 millió metrikus tonnára becsülték, mely 8%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 20%-al csökkent múlt évhez képest. Vetésterületet 5,0 millió hektárra becsülték, 4%-al alacsonyabb a múlt hónaphoz képest de 2%-al magasabb a múlt évhez képest. A 6,60 tonna hektáronként-ra becsült hozam 5%-al alacsonyabb a múlt hónapi hozamhoz képest és 21%-al alacsonyabb a múlt évhez képest.

A korán ültetett és későn ültetett termést a hó és az aszály befolyásolta. Január végén jelentkezett eső ellenére is, a Februárban és Márciusban jelentkezett csapadék elégtelen volt a termés számára és emiatt csökkentek a hozam elvárásai.

**Szójabab Indiában: termelés becslését lecsökkentették**



USDA a 2017/18 évre India szójabab termelését 9,0 millió metrikus tonnára becsülte, 18%-al csökkent 2016/17-hez képest. Hozamot 0,86 tonnára hektáronként becsülték, 12%-al csökkent a múlt évhez képest. A száraz időjárási körülmények miatt a növény vegetációs és virágzási szakasza alatt a hozam csökkent. Betakarított területet 10,5 millió hektárra becsülték, 7%-al csökkent a múlt évhez képest mivel a földművesek nagyobb értékű növényekre váltottak mint például a pamut.

Bár a 2017-es monszún szezon normális volt, az esőzések egész Indiában szórványosak voltak. Az időjárás száraz volt Madhya Pradesh és Maharashtra fő termőterületein a vegetációs és virágzás szakaszai alatt. Augusztusban a heves esőzések visszatértek de a korábbi csapadékhiány megfékezte a növényzet növekedését és a hüvely képződését. Kevés jelentés volt kártevőkről és növény betegségről.

Indiában a nyári monszún Júniusban kezdődik és Szeptember végéig tart. Szójabab vetése általában egybeesik a nyári monszún kezdetével Júniusban és Július végéig tart. Aratás Szeptemberben kezdődik és Novemberig tart.

.


**Szójabab Argentínában: az aszály csökkenti a hozam kilátásait**



Argentína 2017/18 év szójabab termelését 40 millió metrikus tonnára becsülték, 15%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 31%-al csökkent a múlt évhez képest. Vetésterületet 17,5 millió hektárra becsülték, 3%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 5%-al csökkent a 2016/17-hez képest. Hozamot 2,29 tonnára hektáronként becsülték, 12%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 27%-al csökkent a múlt évhez képest. Száraz termőföld lelassította az első és második termés vetését amíg az esőzések meg nem kezdődtek Január végén. Azóta a korlátozott csapadék csökkentette a termés hozamot a későn ültetett növények esetében.

Argentín szójabab számára ez volt az egyik legnehezebb évad a korlátozott csapadék és meleg időjárási körülmények miatt. Buenos Aires és Cordoba tartományban a NDVI (normalizált vegetációs különbségi index) alacsonyabb vegetációs indexeket mutatott.

#### Napraforgómag Franciaországban: a kedvező késő nyári időjárás rekord hozamhoz vezetett



Franciaország napraforgómag termelését 1,6 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, 0,3 mmt-al növekedett a múlt hónaphoz képest és 36%-al növekedett a múlt évhez képest. 2011/12 óta a termelés a legnagyobb. Vetésterületet 0,6 millió hektárra becsülték, 3%-al magasabb mint a múlt hónapban és 7%-al magasabb a múlt évhez képest. Hozamot rekord 2,76 tonnára hektáronként becsülték, 20%-al növekedett a múlt hónaphoz képest és 28%-al növekedett a múlt évhez képest. Franciaország területére az NDVI indexek a nyári vegetációra vonatkozólag átlag feletti voltak nyár végén és kora ősszel és nagy termést jeleztek. Napraforgómag becsléseket úgy állították be, hogy azok tükrözzék a hivatalos betakarítási adatokat.