


MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Búza Oroszországban: nedves időjárási körülmények akadályozzák a tavaszi búza vetését



Kép. Tavaszi búza vetésének előrehaladása: Szibéria kerülete

*USDA- Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma

USDA a 2018/19 évre Oroszország búza termelését 68,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 3,5 mmt csökkenés a múlt hónaphoz képest és 16,5 mmt csökkenés a múlt évi rekord terméshez képest. Oroszországra vonatkozó USDA termelés becslés nem tartalmazza Krím termelését. Az előrejelzet 2,74 tonna hektáronkénti hozam a második helyen van a múlt évi rekord hozamhoz képest. Oroszországban a téli búza a teljes búza termelésnek 70%-át képezi a tavaszi búza viszont 30%-át. A Mezőgazdasági Minisztérium adatai szerint az előrejelzett betakarított terület 26,0 millió hektárról (mha) 25,0 millió hektárra csökkent, ami jelentős vetési késéseket jelez a Szibériai kerületben mely az ország legnagyobb tavaszi búza termelője. A vetés általában Június közepéig befejeződik. Ebben az évben viszont Június 6-ig Szibériában a vetésnek csak körülbelül 76%-a lett befejezve, a végső vetésterület valószínűleg nem fogja elérni a Minisztérium által előrejelzett 5,9 mha. Ha a későbbi ültetés a Szibériai

kerületben követi a 2013-as vetés haladását, melyet szintén késedelmek jellemeztek és gyors Június eleji vetés követte, búza területe elérheti a 4,7 mha.

Vegetációs indexek melyek Észak Kaukázus és Déli kerületekre vonatkoznak (Oroszország fő teli búza termelési régiója) arra utalnak, hogy a termés állapota néhány fontos vetésterületen rosszabb volt mint tavaly Május második felében mikor a termés a fontos virágzási stádiumon megy keresztül. Ez valószínűleg az Áprilisi és Májusi átlagon alatti csapadék és átlagon felüli hőmérséklet miatt volt. Téli búza aratása Június végén vagy Július elején fog kezdődni és Augusztus közepéig fog tartani. Tavaszi búza aratása Augusztus vége felé kezdődik és Október végéig tart.

Búza Németországban: szárazság csökkenti a búza termelését



USDA a 2018/19 évre Németország búza termelését 23,7 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,8 millió vagy 3%-os csökkenés a múlt hónaphoz és múlt évhez képest, de 8%-al csökkent az 5 évhes átlaghoz képest. Vetésterület változatlan maradt 3,1 millió hektár (mha), 4%-al csökkent a múlt évhez és múlt hónaphoz képest.

Hozamot 7,72 metrikus tonnára hektáronként becsülték (mt/ha), mely 3%-al csökkent a múlt hónaphoz képest 1%-al viszont a múlt évhez képest és 4%-al csökkent az 5 éves átlaghoz képest.


Tavaszi szárazság csökkentette a búza hozam potenciálját Németországban. Májusban a szárazság különlegesen problematikus volt mert a búza a nagyon érzékeny virágzási stádiumban volt. Átlagon felüli csapadék mennyiség a tavalyi vetés alatt hozzájárult az utolsó 5 év legalacsonyabb vetésterületéhez.

EU búzáját 149,4 millió tonnára becsülik, mely 1%-al csökkent a múlt évhez képest és 2%-al csökkent az 5 éves átlaghoz képest. Vetésterület változatlan a múlt hónaphoz képest 25,8 mha, 2%-os csökkenés a múlt évhez képest és 3%-os csökkenés az 5 éves átlaghoz képest. A becsült EU betakarított terület a legalacsonyabb az utolsó 10 évben. Hozamot 5,79 mt/ha –a becsülték, 1%-al csökkent a múlt hónaphoz képest de 1%-al növekedett az 5 éves átlaghoz képest. Németországban a 0,8 millió tonna

csökkenés kombinálva a 0,2 mmt csökkenéssel Lengyelországban összesíti az 1,0 mmt csökkenést az EU-nak becsült terméshozamra.

Búza Indiában: rekord hozam növeli a termelést

USDA a 2018/19 évre India búza termelését 97,0 millió metrikus tonnára becsülte, 2%-os növekedés a múlt hónaphoz képest de 2%-al csökkent a múlt évhez képest. Betakarított területet 30,0 millió hektárra becsülték mely változatlan a múlt hónaphoz képest és 3%-al csökkent a múlt évhez képest az ideálisnál rosszabb vetési feltételek miatt a nem öntözött búzaföldeken. Földművesek késleltették a vetést és átváltottak kevesebb vizet igénylő termésekre mint például a csicseribosó Madhya Pradesh és Rajasthan-ban a Novemberi vetés száraz és meleg időjárási körülményei miatt. Fő búza területeken Uttar Pradesh és Madhya Pradesh-ban 2% és 16%-al kevesebb búzát ültettek mint tavaly. Betakarított terület változatlan maradt Punjab-ban. Rekord hozamok az öntözött búza területeken ellensúlyozzák a nem öntözött terület kisebb hozamát. Hozamot 3,23 tonnára hektáronként becsülték, 1%-al növekedett a 2017/18-as rekordhoz képest.




Rekord hozamot jelentettek Punjab-ban, Haryana-ban és Uttar Pradesh-ben. Vetés alatt az átlagos hőmérsékletek a normál hőmérséklettől magasabbak voltak később viszont csökkentek és így elősegítették a vegetatív növekedést Decemberben és Januárban. Ideális hőmérsékletről és csapadékról jelentettek Februárban és Márciusban mikor a növény a reprodukciós stádiumban volt. Vegetációs indexek jó növényzeti állapotról jelentettek az északi búza területeken.

India 2018-as aratása befejeződött. Búzát csak a *rabi* időszak alatt termelik (Októbertől Április végéig tart). Ennek a termésnek a nagyobb részét öntözött körülmények között termesztik. Fő termelők Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana és Bihar.

Búza Mexikóban: utolsó 14 év legalacsonyabb termés becslése

USDA a 2018/19 év Mexikó búza termelését 2,8 millió metrikus tonnára becsülte, 14%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 20%-os csökkenés a múlt évhez képest. Betakarított területet 535,000 hektárra becsülték, 14%-al csökkent a múlt hónaphoz és 20%-al csökkent a múlt évhez képest. Legfrisebb hivatalos adatok szerint a vetésterületben éves csökkenés észlelhető Sonora és Baja California államokban (23% és 37%-ék csökkenés). Hozamot 5,23 metrikus tonnára hektáronként becsülték mely változatlan a múlt hónaphoz képest.




Kép. Mexikó búza (ősz/tél) – havonta ültetett terület előrehaladása

Mexikóban búza termelés fő időszaka az ősztél ciklus mely a teljes termelés körülbelül 98%-át képezi. Téli búza fő termelő államai Sonora (45%) és Baja California (14%). Ültetési műveletek az ősztél ciklusra Novemberben kezdődnek és eltartanak Február elejéig, és nagymértékben függenek az öntözéstől mely szükséges a növénytermesztéshez. Ősz/tél termés aratása Július végén fejeződik be. Becsült termelés a legalacsonyabb az utolsó 14 évben ami tükrözi az alacsonyabb, mint korábban becsült vetésterületet mivel a földművesek alternatív növények termesztését válsztják. Téli búza vetésének kezdetén a víztároló szintjei a fő termelő régiókban 20 és 50 százalék között voltak.


Szójabab Brazíliában: 2017/18 év rekord hozama növeli a termelést

USDA a 2017/18 évre Brazília szójabab termelését 119,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, 2,0 mmt-al vagy 2%-al növekedett a múlt hónaphoz képest és 4%-al növekedett a múlt évhez képest.

Betakarított területet rekord 35,1 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 4%-al növekedett a múlt évhez képest. Hozamot rekord 3,39 metrikus tonnára hektáronként becsülték, 2%-al növekedett a múlt hónaphoz képest és kissé növekedett a múlt évhez képest. Kedvező időjárási körülmények és jobb technológia majdnem mindenhol hozzájárult a hozam növeléséhez, kivéve délen ahol az időjárási körülmények nem voltak kedvezőek. Aratás befejeződött a fő közép és déli régiókban ahol szójababot termelnek és majdnem kész az északi és északkeleti régiókban.



Kép. Brazília 2017/18 hozama




Kép. Brazíl szójabab

Rio Grande do Sul déli részén a szárazság miatt a hozam több mint 11%-al csökkent a múlt évi hozamhoz képest, de a Délen elkezdett vesztességeket ellensúlyozta a Közép-Nyugat és Északkelet hozama. Közép-Nyugat hozama több mint 3%-al magasabb volt a múlt évhez képest. Északkeleten a hozam több mint 5%-al növekedett a múlt évhez képest és Piauí-ban a hozam 15%-al több a múlt évhez képest. Szójabab termelése ebben az évben nagyobb a kivételesen jó csapadék mennyiség miatt mely az északi és északkeleti régiókban volt. Ezekben a régiókban a vegetációs indexek megerősítették a nagyon jó növényzet állapotát és a hozam átlag feletti vagy rekord volt.

Repce Németországban: szárazság virágzáskor csökkentette a hozamot

USDA a 2018/19 évre Németország repce termelését 4,3 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,5 mmt vagy 11%-ék csökkenés a múlt hónaphoz képest de majdnem változatlan a múlt évhez képest és 18%-al van az 5 éves átlag alatt. Vetésterületet 1,3 millió hektárra (mha) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 0,1 mha-al csökkent a múlt évhez képest és 6%-al van az 5 éves átlag alatt.

Hozamot 3,32 metrikus tonnára hektáronként (mt/ha) becsülték, 11%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 4%-al a múlt évhez képest, 13%-al van az 5 éves átlag alatt.



Átlagon aluli tavaszi csapadék problémákat okozott a repcének Németországban, főleg az északi repce övezetben és kisebb mértékben Lengyelországban. A termés Májusban virágzott mikor nagyon meleg és száraz idő volt. A nagy hőmérsékletek meggyorsították a termés növekedését, csökkentették a talaj nedvességét és így csökkentették a hozampotenciált is. Repce aratása Júliusban vagy Augusztusban van. Jelenleg a termés a korai hüvely képződésben van így Június is egy kritikus fejlődési hónap lesz a termés számára.

Németország a második legnagyobb repce termelő az Európai Unióban (EU) Franciaország után (5,5 millió tonna van előrejelezve 2018/19-re) így a csökkenés Németországban jelentős az EU-nak. A termelés változás Németországnak és a 0,1 millió tonna csökkenés Lengyelországnak az egyetlen EU repce változások Júniusra. EU repce termelését most 21,8 mmt-ra becsülik, ami 3%-os csökkenés a múlt hónaphoz és 2%-os csökkenés a múlt évhez képest, és 1%-al van az 5 éves átlag alatt. Vetésterület változatlan marad a múlt hónaphoz képest 6,8 mha, és majdnem változatlan a múlt évhez képest de 2%-al van az 5 éves átlag felett. Hozamot 3,21 mt/ha-ra becsülik.

Szójabab Argentínában: késő esőzések tovább csökkentik a hozam 2017/18 kilátásait


Argentína 2017/18 évi szójabab termelését 37 millió metrikus tonnára becsülték, 5%-al csökkent a múlt hónaphoz és 36%-al csökkent a múlt évhez képest. Vetésterületet 16,8 millió hektárra becsülték, mely 1%-al csökkent a múlt hónaphoz és 8%-al csökkent 2016/17-hez képest. Hozamot 2,20 tonnára

hektáronként becsülték, 4%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 30%-al csökkent a múlt évhez képest.

2017/18 az egyik legroszabb szezona volt a szójababnak Argentínában mivel a nyári termés nagyobb része aszályos körülmények között kellet, hogy fejlődjön. A szezon több erős esőzéssel fejeződött be melyek nem segített a hozamnak és elhalasztotta az aratást. Késő esőzések melyek Április végétől Május végéig tartottak nem voltak hasznosak a korán ültetett és a később ültetett szójababnak sem amelyek már túl károsodtak voltak a felépüléshez. Késői esőzések a vízi utak mentén árvizeket okoztak és lelassították az aratás előrehaladását. Az aratásnak jelenleg 90%-a van befejezve.

Kukorica Oroszországban: 2009 óta a vetésterület először csökken


USDA a 2018/19 évre Oroszország kukorica termelését 15,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte ami 4,0 mmt csökkenés a múlt hónaphoz képest de 1,8 mmt növekedés tavaly óta és csak 0,3 mmt-al van a rekord 2016 aratás alatt. Mezőgazdasági Minisztérium adatai szerint az összes ültetett terület Oroszországban 7%-al csökkent a múlt évhez képest, beleértve a 21%-os csökkenést a Közép kerületben, mely az ország két legfontosabb gabonatermelő kerületének egyike. Hozamot 5,56 tonnára hektáronként becsülték, 13%-os növekedés a múlt évi hozamhoz képest és csak kissé meghaladja a 2016-os rekordot.



Kép. Kukorica Oroszországban: becsült ültetett terület körzetenként

Kukorica Brazíliában: 2017/18-ban kisebb vetésterület és hozam a szárazsággal súlytott második termésnek

USDA a 2017/18 évre Brazília kukorica termelését 85,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 2 mmt vagy 2%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 13,5 mmt vagy 14%-os csökkenés a múlt évhez képest. Betakarított területet 16,9 millió hektárra (mha) becsülték, 0,2 mha vagy 1%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 4%-os csökkenés a múlt évhez képest. Az előző évhez hasonlítva, a terület ahol a kukorica második termését ültették 5%-al csökkent a fő termelési régiókban Közép-Nyugaton és Délen. Hozamot 5,03 metrikus tonnára hektáronként becsülték, 1%-al csökkent a múlt hónaphoz képest és 10%-al csökkent a múlt évhez képest a kedvezőtlen időjárás miatt a déli második termést termelő körzetekben.



Parana-ban (mely a kukorica második termésének 18%-át képezi) és Mato Grosso do Sul-ban (14%), hosszantartó szárazság volt a termés kritikus reprodukciós szakaszaiban, ami csökkentette a talaj nedvességét Március végétől Május elejéig. Csapadék visszatért Május közepén de túl késő volt a károsodás visszafordításához. Déli Mato Grosso do Sul és Parana nagyobb részén a vegetációs indexek rosszabb termés körülményekre utaltak Április közepe óta.

Mato Grosso-ban (42% a kukorica második termésének termelése) és Goias-ban (12%) néhány helyen a vegetációs indexek a kukoricát termelő régiókban késői növény fejlődésre utaltak de általában jó vegetációs körülményeket, hasonlókat mint a 2017 rekord évben. Kukorica második termésének aratása Júniustól Szeptemberig tart.

