



MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Búza Kazahsztánban: az intenzív hőmérsékletek és az átlag alatti csapadék a legfontosabb növekedési szakaszokban csökkentik a hozamot



Kép. Kazahsztánban a nagy hőmérséklet és szárazság befolyásolja a hozamot

Kazahsztán 2021/22 gazdasági év búza termelését 12,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 4% csökkenés a múlt hónaphoz képest és 16% csökkenés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 0,94 tonnára hektáronként becsülték, ami 4% csökkenés a múlt hónaphoz képest és 20% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest. Vetésterületet 12,7 millió hektárra becsülték, mely változatlan a múlt hónaphoz képest és 5% növekedett a múlt évhez képest.




Kép. Átlagos Szezonális Zöldesség Százaléka (PASG) 7/4-9/29/2021

Kazahsztáni búzát leginkább Kostanai, Észak-Kazahsztánban és Akmolában termesztik (a terület 28, 19, illetve 31%-ka, ültetési jelentés alapján). A termés havi csökkenését az átlagosnál alacsonyabb termésviszonyok okozzák, ahogy az az Átlagos Szezonális Zöldesség Százalékában (PASG) látható. A 3 hónapos PASG az átlag alatti állapotokat emeli ki Kostanai-ban, Észak-Kazahsztánban és Akmolában, ahol forró és száraz időjárási viszonyok voltak a legfontosabb természszakokban Júniusban, Júliusban és Augusztusban. Ezenkívül a Kazahsztáni Mezőgazdasági Minisztérium betakarításra vonatkozó előrehaladási adatai alátámasztják az alacsonyabb hozamot. A Mezőgazdasági Minisztérium Szeptember végi jelentése szerint a betakarítás majdnem befejeződött.

Búza Kanadában: termelés előrejelzése csökkent a tavaszi búzaelhagyás várható növekedése miatt

*USDA – Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma

USDA a 2021/22 gazdasági évre (MY) Kanada búza termelését 21,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 2,0 mmt (9%) csökkenés a múlt hónaphoz képest, 14,2 mmt (40%) csökkenés a múlt évi termeléshez képest és 35%-kal van az 5 éves átlag alatt. Betakarított területet 8,5 millió hektárra becsülték, ami 700,000 hektár (8%) csökkenés a múlt hónaphoz képest, 15%-kal alacsonyabb a múlt évhez képest és 11%-kal van az 5 éves átlag alatt. Hozamot 2,47 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 1% csökkenés a múlt hónaphoz képest, 30% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest és 28%-kl van az 5 éves átlag alatt.




Kép. Kanada búza termelése

Kanadai Statisztika (StatCan) az integrált terméshozam-modell frissítései alapján 5%-kal csökkentette teljes búzatermelését és termésbecslését. A modell több adatforrást is figyelembe vesz, beleértve a műholdképeket a Mezőgazdaság és az Agrár-Élelmiszer Kanada (AAFC) Termésállapot-Felmérési Programjából (CCAP). Ez a frissítés az Augusztus hónapban gyűjtött adatokat tartalmazza, amikor a termés megéri és megkezdődik a tavaszi fajták betakarítása. Száraz nyári időjárási viszonyok a Prériken felgyorsították a termés érését és a betakarítást is, amely a korai befejezéshez közeledik. A tavaszi és a durumbúza termése várhatóan jóval az átlag alatt lesz Nyugat Kanadát sújtó történelmi szárazság miatt.

Az iparági források széles körben számoltak be több termés átlag feletti elhagyásáról, és a kanadai növénybiztosítási ügynökségek a takarmányhiány ellensúlyozására ösztönözték a szegény termés takarmánnyként való megmentését. Szárazságviszonyok is jelen voltak az Egyesült Államok nyugati részének nagy részén, az USDA Nemzeti Mezőgazdasági Statisztikai Szolgálat (NASS) Szeptember 20-án kiadott *Kisebb Gabonafélék Összefoglalóban* arról számolt be, hogy a 2021/22 US tavaszi és durumbúza esetében a terület elhagyása megnövekedett. Hasonlóképpen, az USDA a kanadai búza betakarított területre vonatkozó becsléseit a StatCan által jelenleg tartott értékek alá csökkentette, a tavaszi és a durumbúza termés nagyobb mértékű elhagyásával kapcsolatos várakozások miatt, amelyek a teljes búzatermés nagyjából 92% képezik.

Kukorica Guatemala-ban: száraz időjárás és a felesleges csapadék csökkenti a termelést


Guatemala 2021/22 gazdasági év (MY) kukorica termelését 1,6 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 0,3 mmt csökkenés a múlt hónaphoz képest és 45,000 metrikus tonna (3%) csökkenés 2020/21 termeléshez képest. Vetésterületet 900,000 hektárra (ha) becsülték, ami 50,000 ha csökkenés a múlt hónaphoz képest (5%) de viszont 50,000 ha (6%) növekedés a MY 2020/21-hez képest. Hozamot 1,77 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 8% csökkenés a 2020/21 hozamhoz képest.



Kép. Guatemala kukorica termelése


Bár a kukoricát az egész országban termesztik, a legjobban termelő kukorica régiók Észak -Guatemalában találhatók, köztük Petén, Alta Verapaz, Quiché és Huehuetenango.

Guatemalában három fő kukoricatermesztési időszak van. Az első szezon kukoricáját Májusban ültetik, és Szeptemberben szüretelik. A második szezon kukoricáját Októbertől Decemberig ültetik, és Februártól Áprilisig szüretelik. A harmadik szezon kukoricáját Januártól Márciusig ültetik és Szeptembertől Decemberig szüretelik.




Kép. Az aszály és a csapadék befolyásolja a kukoricát Kelet -Guatemalában

A *Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion* (MAGA) jelentést tett a fő kukoricatermés károsodásáról, különösen számos keleti régióban, mint például Zacapa, Jutiapa, Chiquimula és Alta Verapaz. Júliusban bekövetkezett szárazság és magas hőmérséklet megrongálta a Guatemala-i Száraz Öv keleti részén számos kistermelő által termesztett kukoricát. Ezenkívül az Augusztus elején lehullott heves csapadék negatívan befolyásolta a kukoricát Kelet-Guatemalában.




Kukorica Ukrajnában: korai betakarítási eredmények alacsonyabb hozamot jeleznek

Ukrajna 2021/22 gazdasági év kukorica termelését 38,0 millió metrikus tonnára becsülték ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 25% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 7,01 tonnára hektáronként (t/ha) becsülték, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 25% növekedés a múlt évi hozamhoz képest. Betakarított területet 5,4 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de kevesebb mint 1%-kal növekedett a múlt évhez képest.




Ukrán Mezőgazdasági Minisztérium korai betakarítás előrehaladásának adatai alapján a hozam hónapról hónapra csökken. Október 7-én a betakarítás 14% be van fejezve, a hozam jelenleg 5,30 t/ha. Idén késik a szüret a szokásosnál nedvesebb időjárás miatt Szeptemberben. Általában Október elejéig a betakarítás körülbelül egyharmada teljes. Hozam a betakarítás során általában növekszik, mert a betakarítás az

alacsonyabb hozamú déli régiókban kezdődik, és észak felé halad a magasabb hozamú régiókba. USDA
Ukrajnára vonatkozó termelés becslése tartalmazza Krím termelésének becslését is.



Repce Kanadában: termelést és a hozamot lefelé módosították

USDA a 2021/22 gazdasági évre (MY) Kanada repce termelését 13,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 1,0 mmt (7%) csökkenés a múlt hónaphoz képest, 6,5 mmt (33%) csökkenés a múlt évi termeléshez képest és 36%-kal van az 5 éves átlag alatt. Betakarított területet 8,8 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest, 6%-kal nagyobb a múlt évhez képest és 1%-kal van az 5 éves átlag felett. Hozamot 1,48 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 7% csökkenés a múlt hónaphoz képest, 37% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest és 36%-kal van az 5 éves átlag alatt.



Kép. Kanadai repce hozama és 30 éves trendje

Kanadai Statisztikai Hivatal (StatCan) 13%-kal csökkentette a repce hozam és termelés becslését, miután integrált termés hozam-modelljét frissítették, amely Augusztus hónapban új információkat tartalmazott. Modelljük kulcsfontosságú elemei a Július és Augusztus hónapokban gyűjtött műholdfelvételekből származó Vegetációs Index (NDVI) értékek. Az alábbi Sentinel-2 képek NDVI-t alkalmazva kontrasztos termésviszonyokat mutatnak a kritikus szaporodási szakaszokban a repceföldeken Waldheim közelében, Saskatchewan-ban. A bal oldali képen (2020. Július) látható sötétebb zöld szín viszonylag magasabb tavalyi NDVI értékeket jelez, a láthatóbb fényelnyelés következtében, ami az egészségesebb zöld növényzet tulajdonsága.

Ezzel szemben a jobb oldali képen látható világosabb zöldek és sárgák (2021. Július) a tavalyinál alacsonyabb NDVI értékek miatt vannak, mivel a zöld növényzet több fényt tükröz, miközben küzd a 2021-es aszályos körülmények között.



Kép. Repce termésének körülményei Július közepén Waldheim közelében, Saskatchewanban

Az aszályos körülmények különösen nehezítették az idén a repce termését, amelyet elsősorban a Préríben termesztene. A száraz körülmények azonban gyors betakarításhoz vezettek, ami a befejezéshez közeledik. A kezdeti tartományi hozambecslések kedvezően hasonlítanak a StatCan modelljéhez, ami azt jelzi, hogy a repce termése jelentősen csökkent a 2021/22 MY évre.

Szójabab Argentínában: kezdődik a MY 2021/22 ültetési szezon


USDA a 2021/22 gazdasági évre (MY) Argentína szójabab termelését 51,0 millió metrikus tonnára becsülte, ami 2% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 10% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Vetésterületet 16,9 millió hektárra becsülték, ami 2% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 3% növekedés a múlt évhez képest. Hozamot 3,02 tonnára hektáronként becsülték, hasonló a múlt hónaphoz képest de viszont 8%-kal növekedett a múlt évi hozamhoz képest.




Az ültetés csak most kezdődött el de korlátozott mértékben, mivel a jelenlegi alacsony nedvességtartalom miatt későbbi ültetések várhatók ebben a szezonban. A szójabab betakarított területe várhatóan a 2016/17-es MY szintje alatt lesz mivel a gazdák a kukoricát részesítik előnyben. Bár a szójababot magvetéssel és alacsonyabb termelési költséggel állítják elő, a szójabab nem rendelkezik haszonkulccsal mint jelenleg a kukorica az árazás miatt és mivel Argentína szójababra kivetett exportadója csökkenti a nyereséget. A nyers szójababot 33%, míg a szójaolajat és a szója darát 31% adó terheli.

Napraforgómag Ukrajnában: hozam csökken a korai betakarítási eredmények miatt

Ukrajna 2021/22 gazdasági év napraforgómag termelését 17,0 millió metrikus tonnára becsülték, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 21% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 2,43 tonnára hektáronként becsülték, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 21% növekedés a múlt évi hozamhoz képest. Betakarított területet 7,0 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest és megegyezik a tavalyi területtel.



A hozam havi csökkenése a korai betakarítási adatok alapján történik. Október elején a betakarítás csak körülbelül 60% volt befejezve. Az idei termés betakarításának előrehaladása elmarad az 5 éves átlagtól, amely körülbelül 80% volt Október elején. A szüret az átlagosnál nedvesebb Szeptember miatt késett.



A korai betakarítási eredmények alacsonyabb hozamra utalnak, még ebben a normálisnál korábbi előrehaladási szakaszban is, mert az országsszintű hozam csak mérsékelten emelkedik a betakarítási szezon során mivel a betakarítás az alacsonyabb hozamú déli régiókból a magasabb hozamú északi területek felé halad. USDA Ukrajnára vonatkozó termelés becslése tartalmazza Krím termelésének előrejelzését is.