



MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Búza Ausztráliában: rekord termelés

*USDA – Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma




USDA a gazdasági (MY) 2021/22 évre Ausztrália búza termelését rekord 34,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 2,5 mmt vagy 8% növekedés a múlt hónaphoz képest és 0,7 mmt vagy 2% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Vetésterületet 13,1 millió hektárra (mha) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont 0,2 mha vagy 2%-kal növekedett a múlt évhez képest. Hozamot 2,60 tonnára hektáronként becsülték, ami 8% növekedés a múlt hónaphoz képest és szinte megegyezik a rekord hozammal 2016/17-ből mikor 2,61 t/ha volt.



Kép. Ausztrália búza területe, hozama és termelése MY 1991/92-MY 2021/22

A magasabb MY 2021/22-es búzaterület becslést a magas világszertei búzaárak és Ausztrália gabonatermő régióinak nagy részében máig kedvező szezonális feltételek támasztják alá. A hozampotenciál továbbra is átlag feletti, különösen a két legnagyobb termelő államban, Nyugat-Ausztráliában (36%) és Új-Dél-Walesben (26%).





Kép. Ausztrália búza termelése

A vetés óta lehullott bőséges csapadék jótékony hatással volt a termés megtelepedésére és a tenyészidőszak során fenntartott terméspotenciálra. Vegetációs Index (NDVI) a virágzás során átlag feletti termésrőt mutat, különösen Új-Dél-Wales és Nyugat-Ausztrália búzaövezetében. Kelet-Ausztráliában az aratás során lehulló túlzott esőzések aggodalmat keltettek a gabona minőségével kapcsolatban. A betakarítás Novemberben kezdődött a főbb búzatermő területeken és Januárban folytatódik.

Búza Etiópiában: konfliktus csökkenti a betakarítás kilátásait

Etiópiának a 2021/22 gazdasági év búza termelését 4,8 millió metrikus tonnára becsülték, ami 380,000 tonna (7%) csökkenés a múlt hónaphoz képest és 300,000 tonna (6%) csökkenés a múlt évi termeléshez képest. Betakarított területet 1,75 millió hektárra becsülték, ami 150,000 hektár (8%) csökkenés a múlt hónaphoz képest és 100,000 hektár (5%) csökkenés a múlt évhez képest. Hozamot 2,74 metrikus tonnára becsülték, ami 1% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest és 1% csökkenés az 5 éves átlaghoz képest. Annak ellenére, hogy idén a szezonális esőzések kedvezőek voltak, átlag alatti termés várható az észak-etiópiai polgári zavargások miatt ami csökkentette a termesztési tevékenységeket.

Északi Tigray régió 2020 Novembere óta élelem válsággal néz szembe, miután a szövetségi és regionális erők közötti konfliktus emberek ezreit költöztette ki. A Tigray régió az ország búzatermelésének körülbelül öt százalékát termeli, és a régió nagy része krónikusan élelmiszerhiányos. Az elmúlt év északi konfliktusa miatt a bizonytalanság, valamint a vetőmagokhoz és mezőgazdasági alapanyagokhoz való hozzáférés hiánya miatt sok gazdálkodó nem tudott idén ültetni. Kedvező esőzések voltak az idén a középső hegyvidéki búzatermő területek főbb termőterületein, de az országos terméshozamok várhatóan az átlag alatt maradnak a korlátozott mezőgazdasági alapanyagokhoz való hozzáférés hiánya miatt.




Kép. Etiópia búza termelése kerület szerint

Kép. Etiópia búza hozama

A búzatermés csaknem megduplázódott az elmúlt két évtizedben a kedvező kormányzati kezdeményezéseknek köszönhetően, amelyek a vetőmagfajták javítását, a műtrágya-elosztás növelését és a mezőgazdaság kiterjesztését a vidéki területeken ösztönözték. Északi konfliktus és a közelmúltban kialakult Rendkívüli Állapot azonban továbbra is csökkenti a nemzeti betakarítás kilátásait, mivel a földművesek nem tudnak munkaerőt felvenni a betakarításhoz és az utak a bizonytalanság miatt le vannak zárva.


Etiópia a Szub-Szaharai Afrika legnagyobb búzatermelője, ahol a búzát többnyire esős körülmények között termesztik a déli és középső hegyvidéki kis gazdaságokban. A búza fontos élelmiszer növény Etiópiában és az ország teljes gabonatermelésének körülbelül 18%-át képezi. Etiópiában a búzát a fő *meher* esős évszakban, Júniustól Augusztusig ültetik, és Októbertől Januárig betakarítják.

Búza Iránban: az eredetileg vártnál alacsonyabb termelés a szárazság miatt



Kép. Irán: búza termelése

USDA a 2021/22 (MY) gazdasági évre Irán búza termelését 12,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 20% csökkenés a múlt évi termeléshez képest és 11% csökkenés a múlt hónaphoz képest. Vetésterületet 6,0 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt évhez képest de viszont 6%-kal csökkent a múlt hónaphoz képest. Hozamot 2,00 metrikus tonnára becsülték, ami 20% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest. Irán a második legnagyobb búzatermelő a Közel-Keleten 14,5 mmt átlagos termeléssel, a 2016-2020 közötti 5 éves átlag alapján.



Kép. Mezőgazdasági területek közel Mashhad-hoz a Razavi Khorasan tartományban, észak-kelet Irán


Az iráni búza nagy része csapadéktól kapja a nedvességet és az idei szezon átlag alatti csapadékmennyisége kedvezőtlenül befolyásolta a búza növekedését. A kedvezőtlen időjárás az optimálistól elmaradó növekedési feltételeket eredményezett, ami viszont csökkentette a hozamot. A Razavi Khorasan tartományban készült műholdfelvételek rosszabb vegetációs állapotot mutatnak és egyes régiókban a tavalyi évhez képest alacsonyabb téli növényzet borítottságot mutat. Az idei szezon búzatermését 2020 Októberében ültették el és 2021 Júniusában és Júliusában betakarították.

Kukorica Ukrajnában: szezon végi betakarítás eredménye növeli a hozamot



Kép. Ukrajna: kukorica termelése

Ukrajna 2021/22 gazdasági év kukorica termelését 40,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 5% növekedés a múlt hónaphoz képest és 32% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 7,38 tonnára hektáronként (t/ha) becsülték, ami 5% növekedés a múlt hónaphoz képest és 31% növekedés a múlt évi hozamhoz képest. Betakarított területet 5,4 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de kevesebb mint 1%-kal növekedett a múlt évhez képest.




Kép. Kukorica Ukrajnában: előrejelzett terület, hozam és termelés

Az Ukrán Mezőgazdasági Minisztérium szezoni végi betakarítás adatai alapján a hozam hónapról hónapra növekedett. November 25-én a betakarítás 87% be van fejezve, a termés hozam jelenleg 7,33 t/ha. A betakarítás idén később a szeptemberi csapadékosabb időjárás miatt, bár a betakarítás általában utolérte és már csak kis mértékben marad el a november végi 91% 5 éves átlagtól. A termés hozam a betakarítás során növekszik, mivel a betakarítás a gyengébb hozamú déli régiókban kezdődik és az északi magasabb hozamú régiókra költözik. A Földművelésügyi Minisztérium adatai azonban gyakran átlagosan 1 mmt körüli kukoricatermést adnak alul, a különbség pedig leginkább a termés hozamban csökken. USDA Ukrajna termelésének előrejelzése tartalmazza Krím termelésének előrejelzését is.


Kukorica az EU-ban: a második legnagyobb kukoricatermés első sorban a területnövekedésnek köszönhetően

Európai Unió (EU) 2021/22 gazdasági év (MY) kukorica termelését 70,4 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 2,5 mmt vagy 4% növekedés a múlt hónaphoz képest, 5% növekedés a múlt évi termeléshez képest és 9%-kal van az 5 éves átlag felett. Rekord kukorica termelés MY 2014/15-ben volt 75,7 mmt. Betakarított területet 9,4 millió hektárra (mha) becsülték, 3%-kal több a múlt hónaphoz képest és kevesebb mint 1%-kal növekedett a múlt évhez képest. Hozamot 7,52 tonnára hektáronként (t/ha) becsülték, némileg magasabb a múlt hónaphoz képest és 4%-kal növekedett a múlt évi hozamhoz képest.



A MY 2021/22 EU kukoricatermés Decembéri változásai közé tartozik a 87,000 hektáros növekedés Lengyelország területének felülvizsgálata érdekében. Lengyelország MY 2021/22 1,0 mha-os területe rekord. A megnövekedett terület 0,8 millió tonna termelésnövekedést eredményezett a múlt havi becsléshez képest. Emellett a múlt hónaphoz képest 3%-kal megnövekedett hozam 7,23 t/ha-t és rekord 7,3 mmt termést eredményezett. Ezen túlmenően a MY 2020/21-es termésen is jelentős módosításokat hajtottak végre a kormányzati adatok és az USDA Varsói munkatársainak betekintése alapján, hogy tükrözzék a piaci információkat.

**December 2021
Changes to 2021/22 Corn
Production Estimates
Total EU Change:
2.5 MMT**



Source: USDA PSD Online


USDA Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Románia termelése a becslések szerint a múlt hónaphoz képest 0,9 mmt-val 13,4 mmt-ra növekedett. Ez a termés 2,6 mmt-val haladja meg a tavalyi évet, és 9%-kal haladja meg az 5 éves 12,2 mmt átlagot. 2021-ben az időjárás erősen változékony volt Romániában, a legrosszabb körülmények – szárazság és hőség – nyugaton összpontosultak, míg a legjobb körülmények – sok esővel – az intenzíven művelt délkeleten alakultak ki. A déli és keleti növekedések messze meghaladták a csökkenéseket nyugaton.

A nedves, késleltetett termés betakarítása Franciaországban November végén befejeződött. A MY 2021/22-es termelést az EU legnagyobb kukoricatermelőjében, Franciaországban 1,7 millió tonnával 16,0 mmt-ra növelték. A változás magában foglalja a terület 0,1 mha feletti növekedését is 1,6 mha-ra. Iparági források alapján a szilázskukorica jelentős mennyiségét szemeskukoricaként betakarították a nedves körülmények miatt, amelyek fokozták a szénatermelést és csökkentették a silózási igényt.

Repce Indiában: termelés 4%-kal növekedett a múlt évhez képest

USDA a 2021/22 gazdasági évre (MY) India repce termelését 8,9 millió tonnára becsülte, ami 4% növekedés a múlt hónaphoz és múlt évhez képest. Vetésterületet 8,5 millió hektárra becsülték, ami 4% növekedés a múlt hónaphoz és évhez képest, a kedvező ültetési viszonyok miatt és 9%-kal magasabb minimális támogatási ár 2020-hoz képest. Előrejelzések szerint a hozam eléri a 1,04 metrikus tonnát hektáronként, némileg magasabb mint tavaly.




Kép. India 2021 repce vetése 30%-kal növekedett 2020-hoz képest

A *rabi* szezon néhány héttel késett a késői *kharif* betakarítás miatt. A *rabbi* ültetésére általában a délnyugati monszun után, Szeptember 30-a körül kerül sor. A 2021-es délnyugati monszun Október közepén azonban feltöltötte a víztározókat és jótékony talajnedvességről gondoskodott. Indiai Mezőgazdasági Minisztérium 2021. December 3-án közzétett „All India Crop Situation” című kiadványa szerint a gazdálkodók 7,7 millió hektár repcét ültettek el, ami 30%-kal több mint az előző év azonos időszakában. Rajasthanban, mely a legnagyobb termelő, az ültetés közel 42%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát.

Repcét csak a *rabi* szezonban termesztik. A repcét Október végén ültetik Januárig és Március végén van a betakarítás.


Repcé Ausztráliában: rekord termelés

USDA a 2021/22 gazdasági évre (MY) Ausztrália repce termelését rekord 5,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,7 mmt vagy 15% növekedés a múlt hónaphoz képest és 1,0 mmt vagy 22% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 1,83 tonnára hektáronként becsülték, ami 15% növekedés a múlt hónaphoz képest de viszont kissé elmaradt a tavalyi hozamhoz képest.



Kép. Ausztrália repce területe, hozama, termelése MY 1992/93 – MY 2021/22

Az erős árak 22%-kal növelték a betakarított területet az előző szezonhoz képest. A két legnagyobb termelő államban, Nyugat-Ausztráliában és Új-Dél-Walesben a vetés előtt lehullott átlagon felüli csapadék jó tékony talajnedvességet biztosított az ültetéshez és a csírázás során. Kedvező szezonális viszonyok voltak Ausztrália gabonatermő régióinak nagy részén. A repce vetés Áprilisban kezdődik és Június végéig tart. Repce betakarítása jelenleg folyamatban van, és Decemberben fejeződik be.




Kép. Ausztrália: repce termelése

A repcetermesztés a négy fő mezőgazdasági termelő állam között oszlik meg. Új-Dél-Wales termeli Ausztrália repcemagjának legnagyobb részét 31% (5 éves átlag), a fennmaradó termelés Nyugat-Ausztrália (26%), Victoria (25%) és Dél-Ausztrália (18%) között oszlik meg.


Napraforgómag Ukrajnában: végső betakarítási adatok magasabb hozamokat eredményeznek

Ukrajna 2021/22 gazdasági év napraforgómag termelését rekord 17,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 3% növekedés a múlt hónaphoz képest és 24% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 2,54 tonnára hektáronként (t/ha) becsülték, ami 4% növekedés a múlt hónaphoz képest és 26% növekedés a múlt évi hozamhoz képest. Betakarított területet 6,9 millió hektárra (mha) becsülték, ami 1% csökkenés a múlt hónaphoz és múlt évhez képest.




Kép. Napraforgómag Ukrajnában: előrejelzett terület, hozam és termelés

Az Ukrán Mezőgazdasági Minisztérium szezon végére vonatkozó betakarítás adatai alapján a terület hónapról hónapra csökken míg a hozam hónapról hónapra növekszik. November 25-én a betakarítás majdnem befejeződött a becslések szerint 6,5 mha-on, a hozam 2,50 t/ha, a termelés pedig 16,17 mmt. Az elmúlt néhány évben a Mezőgazdasági Minisztérium aluljelentette a hozamokat az Állami Statisztikai Szolgálatához (SSS) képest, és ez az elfogultság várhatóan a folyó évben is folytatódik. A napraforgómag termelést az SSS is rendszeresen, átlagosan körülbelül 7%-kal aluljelenti. Az USDA a napraforgómaggal kapcsolatos végső becsléseket a napraforgóolaj és a vetőmagexport kereskedelmi adatok felhasználásával módosítja. Ezért ezek a többszörös tényezők felelősek a Mezőgazdasági Minisztérium adatai és az USDA becslései közötti különbségért. USDA Ukrajna termelésére vonatkozó előrejelzése tartalmazza Krím termelésének előrejelzését is.




Szójabab Paraguay-ban: korai szárazság korlátozza a várható termelést

USDA a 2021/22 gazdasági évre Paraguay szójabab termelését 10,0 millió metrikus tonnára becsülte, ami 5% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 1% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Vetésterületet 3,4 millió hektárra becsülték, ami 1% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 8% növekedés a múlt évhez képest. Szójabab első termésének ültetése befejeződött. Hozamot 2,94 tonnára hektáronként becsülték, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest és 6% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest.



A szójabab termelési várakozások csökkentek, miután a gazdálkodók nagyon száraz szántóföldi körülményekkel szembesültek. Például Canindeyú megyében a Vegetációs Index 2000 óta az egyik leghosszabb ideig tartó rossz vegetációs időszakot mutatja. Szeptember 30. óta és November nagy részében száraz volt Canindeyúban,

10-15 nap telt el azóta, hogy más régiókban elegendő csapadék hullott. Szárazságról számoltak be Amambay megyék szőjabab területein, San Pedro egyes részein és Caaguazú egyes részein.



Annak ellenére, hogy néhány helyen November végén csapadék hullott, a legtöbb területen korlátozottak a talajnedvesség tartalékok a növények növekedéséhez. December számos szőjafajta számára kritikus időszak, mivel a növények kezdeti rügy és ágfejlődésbe kerülnek.